Nachtreiher [A023]

(Nyctocorax nyctocorax)



Foto: F. Junge / shutterstock.com

Lebensräume in Baden-Württemberg

Bewohner der gewässernahen Bereiche von Weichholzauenwäldern und Sumpfwäldern, Verlandungszonen und gehölzbestandenen Inseln.

Raum- und Zeitdynamik

- Zugvogel.
- Jahreszeitliches Auftreten: April bis September.
- Fortpflanzungszeit: 01.04.–15.09.
- Koloniebrüter, teilweise vergesellschaftet mit anderen Reiherarten
- Wiederbesiedlung von Baden-Württemberg im Jahr 2000; seitdem seltener alljährlicher Brutvogel mit Ausbreitungstendenz.

Habitatstrukturen im Wald

Nahrungshabitat

- Jagt Amphibien, Fische und Insekten.
- Feuchtgebiete und Altwasserkomplexe im Waldverbund, aber auch Kiesweiher. Auch fernab der Brutreviere.
- Bevorzugt mäßig schnell fließende oder stehende, klare Gewässer mit dichter Randvegetation.

Bruthabitat

- Randbereiche der Auen- und Sumpfwälder, Verlandungszonen und gehölzbestandenen Inseln.
- Über dem Gewässer herunterhängende Äste werden als Ansitz genutzt.
- Als Brut- (und Schlaf-)bäume werden vor allem im Wasser stehende Bäume genutzt; nutzt selbstgebauten Horst (meist in geringerer Höhe bis 5m) z. T. über mehrere Jahre.

Landesweite Erhaltungsziele mit Waldbezug

- „Erhaltung einer dichten Ufervegetation und zur Nestanlage geeigneter Baumbestände.
- Erhaltung der bestehenden Graureiherkolonien.
- Erhaltung des Nahrungsangebots mit Amphibien, Kleinfischarten und Jungfischaufkommen sowie Kleinsäugern.

→

- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während der Fortpflanzungszeit (01.04.-15.09.).“
  (Vogelschutzgebietsverordnung 2010, Anlage 1)

Erhaltungsmanagement

Von welchen Forstbetriebsarbeiten profitiert die Art?

✔ Bei an die Art angepasster Umsetzung des AuT-Konzeptes sind im Rahmen naturnaher Waldbewirtschaftung keine weiteren Erhaltungsmaßnahmen notwendig:
  - Erhaltung und Markierung bekannter Horst-, Schlaf- und Ruhebäume.
  - Belassen potentieller Horstbäume, v. a. gewässernaher oder im Wasser stehender Baum- und Buschweiden.

Welche Forstbetriebsarbeiten können erhebliche Beeinträchtigungen darstellen?

✘ Aushieb von Überhältern und Horstbäumen.
✘ Eingriffe in den Baumbestand im unmittelbaren Horstbereich (eine Baumlänge).
✘ Veränderung des Waldcharakters bei Holzerntearbeiten im Umkreis von 100 m um Horst- und Schlafbäume. Das können alle über Einzelstammentnahme hinausgehenden Hiebsformen sein.
✘ Störungen durch forstliche Arbeiten in der Fortpflanzungszeit im Umkreis von 200 m um besetzte Horste.
✘ Erschließungsmaßnahmen im Nahbereich besetzter Horstbäume.

Resümee

Lichtwaldart mit enger Gewässerbindung und damit eine typische Art der Weichholzaue mit ausgedehnten, eng mit dem Wald verzahnten Gewässern und Verlandungsbereichen.

Soweit Maßnahmen erforderlich werden, gehen diese zumeist über typische forstbetriebliche Waldbewirtschaftungsmaßnahmen hinaus. Wichtig ist der Erhalt von störungsfreien Brutplätzen.

In Vogelschutzgebieten ist der jeweilige Managementplan zu beachten!

Verbreitung Baden-Württemberg

Brutzeitverbreitung des Nachtreihers in Baden-Württemberg im Zeitraum 2017-2022. Daten und Auswertung: OGBW. Kartengrundlage: Geobasisdaten LGL BW.

Schutzstatus/ -verantwortung

Vogelschutz-Richtlinie:	**Anhang I**
Geschützt nach § 44 BNatSchG	
Rote Liste Deutschland (2015):	**1**
Rote Liste BW (2019):	**R**
LUBW-Artenschutzprogramm:	**Nein**
Waldzielart:	**Nein**

Es besteht eine hohe Verantwortung Baden-Württembergs.

Weiterführende Informationen

Informationen zur Art: Im Portrait – die Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie

Zu Maßnahmen im Wald: Handlungsempfehlungen für Vogelschutzgebiete

Brutbestand und Trend

Baden-Württemberg
Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat